



KALENDER FÖR SÅDD

Vill du se den på ett
annat språk?



SKANNA DET.

	VÅR			SOMMAR			AUTUMN			VINTER			SPACERING AV SEED	DJUP	GRÖNINGSTID	TRANSPLANTATION (SEDAN SÄNING)	IRRIGERING	SKÖRD (SEDAN SÄDD)	TYP	ANVÄNDINGSOMRÅDEN OCH TILLÄMPNINGAR		
	MAR	APR	MJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAN	FEB								KULINARISKA	MEDICINSKA	KOSMETISKA
KORIANDER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				2.5 CM	1 - 2 CM	7 - 12 DAGAR	30 - 40 DAGAR	REGELBUNDEN	50 - 90 DAGAR	ETTÅRIGA	✓	✓	
BASILIKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					2.5 CM	1 - 2 CM	10 - 15 DAGAR	60 - 90 DAGAR	REGELBUNDEN	90 - 120 DAGAR	ETTÅRIGA	✓	✓	✓
PERSILJA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.5 CM	1 - 2 CM	15 - 30 DAGAR	30 - 60 DAGAR	REGELBUNDEN	60 - 90 DAGAR	TVÅÅRIGA	✓	✓	
TIMJAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				5 CM	2 - 3 CM	7 - 14 DAGAR	60 - 90 DAGAR	INTENSIV	90 - 120 DAGAR	FLERÅRIGA	✓	✓	✓
OREGANO	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓					5 CM	2 - 3 CM	5 - 14 DAGAR	60 - 90 DAGAR	INTENSIV	90 - 120 DAGAR	FLERÅRIGA	✓	✓	



SÅDD



SKÖRD



BÅDA

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN ETTÅRIGA, TVÅÅRIGA OCH FLERÅRIGA VÄXTER?

Ettåriga växter är växter som fullbordar sin livscykel på ett år och dör efter att ha producerat frön. Tvååriga växter fullbordar sin livscykel på 2 år. Sedan finns det perenner som har en permanent karaktär och förnyar sin tillväxt varje år.

ANMÄRKNINGAR OM TRANSPLANTATIONSTID:

Tidpunkten för omplantering kan variera beroende på faktorer som temperatur, luftfuktighet, ljus och jordmån.

Det är viktigt att komma ihåg att det är bäst att transplantera växter när de är unga och fortfarande små för att undvika att skada rötterna och för att säkerställa god överlevnad. Dessutom är det viktigt att förbereda jorden och välja en lämplig behållare som är tillräckligt stor för växtens rotstorlek innan du transplanterar.

ANTECKNINGAR OM TIDPUNKTEN FÖR INSÄMLINGEN:

Skördetiden från sådd av följande växter kan variera beroende på faktorer som sort, väderförhållanden, skötsel och personliga preferenser hos den enskilda odlaren när det gäller storlek och smak på skörden.

Varje växt har en optimal tid för tillväxt och mognad då skörden kan sköras och användas. Sort, klimatförhållanden och korrekt skötsel är viktiga faktorer som kan påverka tidpunkten för skörd och det är viktigt att övervaka växtens tillväxt för att bestämma den optimala skördetiden.

Genom att skörda vid rätt tidpunkt kan de bästa resultaten och maximal produktion erhållas från varje planta.

NOTER OM BEVATTNING

Det är viktigt att notera att vattningsfrekvensen också kan påverkas av faktorer som klimat, geografiskt läge och jordtyp.

I varma klimat kan det vara nödvändigt att vattna oftare för att hålla jorden fuktig. I kalla klimat med frekvent nederbörd kan det vara nödvändigt med mindre frekvent vattnings.

Det är viktigt att undvika övervattnings, eftersom det kan skada rötterna och få växten att ruttna. Det är bäst att vattna sparsamt och se till att jorden torkar ut mellan vattningsarna.

VIKTIGT!

De tider som anges i denna kalender är ungefärliga och kan variera något beroende på de särskilda förhållanden och den plats där växterna odlas.